Les risques NRBC-e

RÔLE DE LA SANTE

Soirée du 2 octobre 2014 de l'AMPHIV

Nucléaire

Radiologique

Biologique

Chimique

explosif

Un peu d'histoire....

Enveloppes anthrax

Attentat du world trade center

New-York 2001

Attentat au gaz sarin

Tokyo 1995

Accidents industriels

Seveso 1976, Bhopal 1984,
Tchernobyl 1986

Quel contexte

- Risque terroriste
- Risque industriel
- Risque lié aux transport de matières dangereuses

Organisation de l'état

les textes

- Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale
- Le plan gouvernemental NRBC
- Les circulaires interministérielles (700,750,800...)
- Le plan zonal de mobilisation
- Les plans blancs élargis

Plan Gouvernemental NRBC

1

- Menace imminente d'attentat NRBC ou revendication d'une action dont la réalité n'est pas établie (phase d'alerte).

2

- Découverte d'engins NRBC ou de terroristes prêts à disperser des agents RBC (y compris par attaque d'une installation NRBC, détournement ou attaque d'un transport de matières dangereuses).

3

- Dispersion de matières NRBC visant directement la population

4

- Contamination de produits de consommation (eau potable, aliments, cosmétiques et produits de santé, etc..)

5

- Contamination ou infection avérée d'animaux ou de végétaux.

6

- Apparition dans la population de symptômes imputables à une dispersion d'agents RBC.

Organisation de la santé

Echelon national

Ministère de la Santé

Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS)

Echelon zonal

Agence Régionale de Santé de Zone (ARSZ)

Etablissement sanitaire de Référence (ESR)

Echelon Régional

Agence Régionale de Santé de Région (ARS)

Echelon départemental

Etablissements de Santé (ES)

REPARTITION DES ZONES DE DEFENSE

ZDSO

5.07.2000

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes

L'organisation des soins

Et en pratique ?

- NR B ou C = Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE)
- Risque d'afflux massif de victimes
- Risque de transfert de contamination
- Savoir reconnaître une SSE:
 - ❑ Protection des intervenants (choix des EPI)
 - ❑ Périmètre d'intervention (zonage du chantier)
 - ❑ Prise en charge spécifique de victimes NRBC

Être en mesure de reconnaître une SSE de type NRBC

- Notion d'explosion, bruit de gaz
- Présence d'un nuage, de fumées
- Notion de plusieurs victimes présentant des symptômes irritatifs, respiratoires et/ou neurologiques (malaises, convulsions...)
- **D'autant plus** qu'on est :
 - En lieu clos (métro, tunnel...)
 - Ou lieu particulier (usine SEVESO)
 - Ou rassemblement de foule (meeting de St Jacques...)

Protection des intervenants

choix des EPI

Risques « NR » « B »

- Tenues Tyvek®
- Masque FFP3 ou FFP2
- Lunettes de protection
- 2 paires de gants UU
- surbottes

Risque « C »

- En EPI (TOM, masques + cartouche, gants butyle et surbottes)
 - ❑ Uniquement au niveau du PRV (point de rassemblement des victimes)
 - En zone contrôlée
- En tenue classique
 - ❑ Au niveau du PMA

Périmètres d'intervention

zonage du chantier

Les différentes zones « C » et « NR »

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes

Les différentes zones « C » et « NR » (2)

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes

Le Point de rassemblement des victimes (PRV)

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes

Organisation des secours

Délimitation de la **zone de danger immédiat** (rayon de 100 m autour du point initial)
Alerte, reconnaissance, extraction d'urgence, décontamination d'urgence
Evacuation vers les structures de soins et de décontamination
Identification du produit

Délimitation de la **zone contrôlée**
alerte, confinement, médecine de l'avant
point de regroupement des victimes

Délimitation de la **zone de danger sous le vent**
Alerte, reconnaissance et confinement et/ou évacuation
Regroupement et évacuation vers les structures de soins et de décontamination

PLAN PIRATOX + ORSEC
départemental
secours à de nombreuses victimes

ANNEXE 4

Schéma du dispositif à mettre en place (plan Piratox + ORSEC départemental) destiné à porter secours à de nombreuses victimes

Prise en charge spécifique de victimes NRBC sur le terrain

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes

Risque « NR » soins au PRV

- La réanimation prime sur la décontamination
 - Ratio soignant / victimes
- Décontamination d'urgence
 - Aspersions des vêtements avec pulvérisateur d'eau
 - Protection des VAS
 - Masque FFP3 ou FFP2
 - Cagoule
- Sinon technique de la double enveloppe
 - vinyl

Double enveloppe

Risque « C » quoi faire au PRV?

➤ Tri médical

- PRV valide
- PRV invalide
- Présence de signes ou non

➤ Quelles victimes décontaminer en premier?

- Les victimes nécessitant une évacuation rapide (UA)
- Les victimes présentant des signes irritatifs, neurologiques et/ou respiratoires
- Puis les autres (victimes asymptomatiques)

➤ Soins

- Uniquement si ratio soignants/victimes le permet
- Difficile en tenue NRBC

Risque « C » quels soins au PRV?

➤ Décontamination d'urgence

- Retrait des couches d'habits les plus superficielles
- Retrait des chaussures
- Pose de terre à foulon sur les parties découvertes
- Pose d'une protection respiratoire
 - Cagoules de fuite (SP)
 - Masque HC + O2 (SMUR)

➤ Prise en charge d'une détresse

- Ratio soignants/victimes le permettant
- O2 MHC si DR
- Intramusculaire?
 - Seringue tri-compartmentées non encore disponibles
 - Lavage oculaire

➤ Antidote?

Terre à Foulon

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes

Et à l'hôpital ?

- **Aucune** victime ne doit pénétrer dans la structure sans décontamination préalable
 - Plan Blanc déclenché sous la responsabilité du directeur de garde
 - Bouclage (filtrage des entrées) de l'hôpital, installation d'un PRV
 - Ouverture de l'UDH
 - Décontamination
 - CRV ou SU
 - CUMP

Merci de votre attention

Dr Denis Bouëxière CHU de Rennes